

AINES : ácido acetil salicílico; aspirina prevent o aspirinetas

- Analgésico para dolor de poca intensidad
- Antipirético
- Antiagregante plaquetario; se utiliza en personas con riesgo de trombosis 100 mg
- Compuesto líder Bayaspirina , Cafiaspirina
- Ácido muy irritante
- Síndrome de Reye ; es un daño cerebral súbito (agudo) y problemas con la actividad hepática que no tienen una causa conocida.El síndrome se ha presentado en niños a quienes les han dado ácido acetilsalicílico cuando tenían varicela o gripe. El ácido acetilsalicílico dejó de recomendarse para uso rutinario en niños.

AINES : paracetamol (acetaminofen)

- Es analgésico (cefalea) y antipirético

No antiinflamatorio!!

Tafirol 500, tafirol forte 650 , tafirol 1 gramo

- Paracetamol raffo 500mg o 1gramo , Termofren gotas 2gotas/kilo, y jarabe.
- Dosis terapéuticas no producen alteraciones Gastrointestinales ni en las plaquetas.
- Usado en embarazadas

AINES :Indometacina

- Potente inhibidor de la síntesis de prostanglandinas
- Analgésico, antiinflamatorio y antipirético
- Usos en procesos artríticos (**limitación por efectos adversos**) anorexia, náuseas, dolor abdominal, úlceras y hemorragias.
- Trombocitopenia , alteración de la función plaquetaria.
- I.M. 75 comprimidos, gel , crema, supositorios

AINES;Ácido mefenámico ; Ponstil forte x 15 y 30 comprimidos

- Analgésico , no muestra ventajas con respecto a otros AINES.
- Dolores moderados ; amenorreas
- Procesos artríticos AR , su toxicidad limita su uso .
- Alta incidencia de náuseas vómitos, diarrea dolor abdominal, anemia
- Dismenorrea primaria : contracciones uterinas anormales. Dolores menstruales

AINES : Dipirona; NOVALGINA , DIOXADOL

- Analgésico, antiinflamatorio y antipirético
 - Aplicaciones ; dolor post operatorio, cólico, fiebre refractaria a otro antitérmicos.
 - Efectos adversos , ocasionalmente reacciones alérgicas , agranulocitosis (es la ausencia de ciertos glóbulos blancos en la sangre (los granulocitos neutrófilos), que forman parte del sistema de defensa del organismo.
 - anemia(la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos)
- trombocitopenia; disminución de la cantidad de plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales.
- Vías , oral, Im , iv .comprimidos , y jarabe.

AINes:Diclofenac;Dioxaflex, Blokium , Xedenol

- Alta potencia como antiinflamatorio, analgésico y antipirético mayor que indometacina , naproxeno.
- Artritis ,lesiones del músculo , hombro(tendinitis) ,dolor post operatorio, dismenorrea.
- Efectos adversos ; gastrointestinales(úlceras) , y renales.se usa con misoprostol (se busca conservar eficacia y proteger la frecuencia úlceras y erosiones GI)
- Dioxaflex 50mg, 75mg y 100mg blokium , xedenol, metaflex ,(comprimidos , inyectables , cremas y geles 5% y al 1%)

AINES : Ketorolac

- Sinalgico 10mg 20 mg y Dolten comprimidos, 10 mg sl y inyectable 30mg
- Analgésico potente, antiinflamatorio moderado
- Dolor post operatorio, agudo a grave, no utilizar mas de 2 o 3 días por la elevada incidencia de hemorragia gastroduodenal.
- Efectos adversos ; dolor gastrointestinal, mareos cefalea, dispepsia y náusea.
- Es costoso

AINES : NAPROXENO;NAPRUX, ALIDASE

- Naprux , Alidase : 500 mg y 250 mg.
- POSEE UN TIEMPO MÁS LARGO ; QUE IBUPROFENO
- SE ADMINISTRA DOS VECES AL DIA PARA LAS MISMAS INDICACIONES QUE EL IBUPROFENO.
- 20 Veces mas potente que aspirina
- EFECTOS ADVERSOS ; dispepsia, molestias gástricas y hasta hemorragia gástrica.

Flurbiprofeno : Clinadol Forte

Flurbiprofeno :100 mg y 200 mg comprimidos (Clinadol forte
Clinadol forte AP)

Clinadol forte ; Colutorio

Usos dismenorrea y dolores de muela

AINES : IBUPROFENO

- AAA
- Usos ; procesos inflamatorios crónicos
artritis, tendinitis , dismenorrea.
- Ibuprofeno a largo plazo es el más inocuo,
- Mejor tolerado que otros aines, por la baja incidencia de efectos adversos
- Ibupirac, Actron, Ibutenk , Ibuzidine (cápsulas blandas), Febratic, 400 MG , 600 MG , JARABE 2 % Y 4%. Ibupirac, Actron , Febratic , Ibuzidine, Ibuprofeno gotas: **Ibupirac** Gotas

AINES; Piroxicam Vannier

- Es equivalente a aspirina , indometacina o naproxeno, puede ser mejor tolerado que estos.
- Efectos adversos ;
gastrointestinales, úlcera.
- Usos : signos y síntomas de osteoartritis y artritis reumatoidea, lumbalgia ,etc.

AINES: clonixinato de lisina

- Dorixina.

Analgésico antiinflamatorio con acción analgésica predominante.

- Efectos adversos ; náuseas vómitos, sequedad bucal, constipación, diarrea mareos , somnolencia.
- Usos : dolor leve a moderado

Dexketoprofeno

Dexketoprofeno : Enantyum

Usos : dolor musculares

Dolor de muelas ,postoperatorios

Presentación : comprimidos y gel

Loxoprofeno !

Loxoprofeno 60 mg : Oxeno !

Viene en comprimidos

Artritis reumatoidea, osteoartritis,
lumbalgia. Analgésico y antiinflamatorio
luego de cirugía, traumatismo o
extracción dentaria

AINES :Inhibidores selectivos de la COX2 ; meloxicam

- La inhibición selectiva de la COX2 puede reducir la inflamación sin mostrar los efectos adversos en riñones y vías gastrointestinales.
- Esto puede deberse a su selectividad relativa variable en cuanto a COX1 en comparación con COX 2
- Efectos adversos: hipertensión y edema.

Arcoxia etoricoxib

- **Arcoxia 60, 90 120 mg**
- Pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores selectivos de la COX-2
- Ayuda a reducir el dolor y la hinchazón (inflamación) en las articulaciones y músculos de personas mayores con artrosis, artritis reumatoide, (artrosis ; ruptura gradual del cartílago que amortigua los extremos de los huesos. Esto provoca hinchazón (inflamación), dolor, sensibilidad, rigidez e incapacidad). artritis ; La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de larga duración de las articulaciones. Causa dolor, rigidez, hinchazón.

Analgésicos Opiáceos:

- Morfina
- Metadona
- Nalbufina
- Codeína
- Dextropropoxifeno
- Tramadol
- Los opiáceos no deben consumirse con otras sustancias depresoras del Sistema Nervioso Central (SNC) como alcohol, antihistamínicos, ansiolíticos (tranquilizantes) o anestésicos.

Codeina +paracetamol

Dolofrix : codeina-paracetamol 30/500

Dolofrix forte: codeína-paracetamol 60/300

Novo klosidol : codeina-diclofenac 50/50

Codelasa jarabe : codeína+asoc

Mensalgin : Codeina +ibuprofeno 12,5/200

Dextropropoxifeno + asociados

- En Argentina se encuentran disponibles en las siguientes presentaciones: **Dextropropoxifeno-Ibuprofeno.**
- ⇒ SUPRAGESIC – BETA (Comprimidos y un frasco-ampolla y una ampolla)

Dextropropoxifeno-Dipirona.

- ⇒ KLOSIDOL – BAGÓ (Comprimidos y ampollas)
- ⇒ DORIXINA FORTE (Ampollas) Lab. Roemmers

Dextropropoxifeno-Dipirona + asoc.

- ⇒ KLOSIDOL B1 B6 B12 – BAGÓ (Comprimidos : dextropropoxifeno, Dipirona

.Dextropropoxifeno- Clonixinato de Lisina.

- ⇒ DORIXINA FORTE (Comprimidos) Lab. Roemmers

Tramadol : calmador , tramal

- Cloq ,Calmador , Tramal ,Supragesic
Comprimidos 50 mg , 100 mg ,inyectables , y gotas
- Analgésico opioide de acción central
- Usos ;tratamiento del dolor de intensidad moderada a severa
- Efectos adversos :Somnolencia, dolor de cabeza, boca seca y sudoración son algunos ejemplos de los efectos secundarios. Los síntomas menos comunes son diarrea, náusea y problemas estomacales e intestinales.